

خون کی نالیوں سے دوا کار ساؤ Extravasation



Extravasation کی صورت میں آپ کو علاج کے لئے ضروری ہدایات دی جائیں گی۔ مثلاً متاثرہ جگہ پر (ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق) کریم لگانا، متاثرہ بازو اور ہاتھ کی ورزش اور (اگر ضرورت ہو تو) دردو کے والی ادویات کا استعمال شامل ہے۔ کسی بھی قسم کی مددیاد یا معلومات کے لئے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کریں۔

فون: +92 42 35905000

کیو تھیسری اپی ڈیپارٹمنٹ: 24 گھنٹے سروں

شعبہ بالغان: 5016

شعبہ بچگان: 5014

شعبہ داخل مریضان:

2291, 2292 : Inpatient - ii (A)

2295 : Inpatient - ii (B)

2395, 2399 : Inpatient - iii

PSS/RAD/0140714

تاہم انتقال دوا کے وقت اگر آپ دوائی دیجے جانے کی وجہ درد یا کوئی دوسرا تہذیبی محسوس کریں تو فوری طور پر اپنی نرس کو مطلع کریں۔

نرس کو کسی بھی مسئلہ کی نشاندہی آپ کے ہاتھ سے ہی ہوگی۔ جس کے بعد تاہم کوئی علاج یا خانٹی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔

(Extravasation) کی تصدیق یا خدش کی صورت میں آپ متعلقہ جگہ کا دن میں ایک بار ضرور معاشر کریں تاکہ دیکھا جاسکے کہ:-

۱۔ متاثرہ جگہ کی رنگت میں کوئی تہذیب تو نہیں آئی یا سرفی میں اضافہ تو نہیں ہوا۔

۲۔ متاثرہ جگہ پر آبلے تو نہیں ہن گئے۔

۳۔ متاثرہ جگہ پر خارش تو محسوس نہیں ہو رہی۔

۴۔ درد کے سبب ہاتھ یا یا بازو کی حرکت میں یا درزش کرنے میں مشکل تو نہیں پیش آ رہی۔

مندرجہ بالا علامات میں سے کسی ایک یا زیادہ کے ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً شوکت خام میوریل کیفیت ہپتال سے رابطہ کریں۔

(رابطہ نمبر آخر میں درج ہے)۔

کیا (Extravasation) سے بچاؤ ممکن ہے؟

درست سوئی (IV. Cannula) کے انتخاب اور ہاتھ یا بازو پر اسے ٹھیک لگانے سے گوکر Extravasation کے خطرہ کو کم کیا جاسکتا ہے لیکن اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے نس میں دوا لگئے ہونے کے دوران (سوئی گلی جگہ یا اس کے گرد) کسی بھی تہذیب کی صورت میں ذیوقی پر موجود نرس کو فوراً مطلع کریں تاہم فوری عمل کے باوجود بعض دوائیں باقتوں کو زیادہ انقصان پہنچا سکتی ہیں جس کے لئے مریض کو کسی پلاسٹک سرجن سے مشورہ لینا پڑتا ہے۔

علاج کیسے کیا جاتا ہے؟

شوکت خام میوریل کیفیت ہپتال میں Extravasation کے علاج کے لئے دوائیں اور بہتر انتظام کیلئے واضح پالیسی موجود ہے اور ہپتال میں کام کرنے والے تمام متعلقہ عملکاروں کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔

کیموجھراپی لگانے کے دوران دوا کا خون کی نالیوں سے خارج ہونے اور نتھجتاً ارڈگرد کے خلیوں میں داخل ہو کر سوزش اور تکلیف کا باعث بننے کو Extravasation کہا جاتا ہے۔

(Extravasation) کی وجوہات:-

اس کی صحیح وجہ کا اگرچہ ہمیشہ پتہ نہیں چلتا تاہم بعض لوگوں میں اس کا خطرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً

۱۔ ایسے افراد جن کے خون جمانے کے خلیے (پلیٹ لٹ) (Platelet) کی مقدار کم ہو۔

۲۔ ایسے افراد جن کو پہلے یہ کیموجھراپی بذریعہ دریڈ بہت زیادہ مقدار میں دی گئی ہو۔

۳۔ بچے۔

۴۔ زیادہ عمر کے لوگ۔

۵۔ پریشان یا مختصر بلوگ۔

(Extravasation) کی علامات:-

دریڈ میں دوا کے انتقال کی جگہ پر اس کے ارڈگرد سرفی، سوزش یا خراش، حرارت، درد، بلن یا سو جن کا محسوس ہونا۔

خوش قسمتی سے علامات میں شدت کم ہی دیکھنے میں آتی ہے تاہم یہ جلد کی اوپر والی سطح پر سوزش یا آبوں سے لے کر جلد کے نیچے پھوٹوں کو انقصان پہنچانے تک ہو سکتی ہے۔

تشخیص کیسے کی جائے؟

اس کی تشخیص آسان نہیں کیونکہ بعض دواؤں سے جزوی رنج آتے ہیں۔ تو کچھ دوائیں جلد پر (علاج کی جگہ کے گرد) سرفی کا باعث بنتی ہیں۔