

اینستھیزیا



## MISSION STATEMENT

To act as a model institution to alleviate the suffering of patients with cancer through the application of modern methods of curative and palliative therapy irrespective of their ability to pay, the education of health care professionals and the public and perform research into the causes and treatment of cancer.

شوکت خانم  
ممبریل کینسر ہسپتال  
اینڈ ریسرچ سینٹر



Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre  
7A Block R-3, Johar Town, Lahore, Pakistan.

Tel: 042 359 5000 | UAN: 111 155 555

[www.shaukatkhanum.org.pk](http://www.shaukatkhanum.org.pk)

## اینسٹیمیز یا بے ہوشی کے بعد بچوں کیلئے ہدایت نامہ:

آپ کا بچہ گھر جانے کیلئے تیار ہے تاہم گھر پر اس کی خصوصی دیکھ بھال کی شد ضرورت ہوگی کیونکہ سکون آور یا بے ہوشی کی دوا کے اثرات اگلے کئی گھنٹے تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ درج ذیل ہدایات پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی بہتر دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔

## کھانا پینا:

اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ مت پلائیں جب تک پوری طرح جاگ نہ جائے۔ بے ہوشی کے دو گھنٹے بعد شفاف مشروبات جیسے پانی، سیب کا جوس، پیڈیلاٹ اور ماں کا دودھ دے سکتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بے ہوشی کی ادویات کے استعمال کے بعد سر چکرانا، ایبائی آنا اور تھوے وغیرہ معمول کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کا بچہ تھوے کرے تو اگلے کم از کم آدھے گھنٹے تک اسے کچھ پینے کو نہ دیں البتہ آدھے گھنٹے کے بعد اسے شفاف مشروبات کے چھوٹے چھوٹے گھونٹے دیں۔ آپ اسے ایک سے دو اونس مشروب پلا سکتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ لگا تارے کرتا رہے تو پھر اس ہدایت نامہ کے آخر میں دیئے گئے نمبروں پر ڈاکٹر یا ہسپتال سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ اس قابل ہے کہ شفاف مشروبات پینے سے ایبائی یا تھوے نہیں کرتا تو پھر اسے آہستہ آہستہ نرم غذا کا استعمال شروع کرنا چاہئے جیسے دودھ، دہی، کبیر، چاول، اُبلایا ہوا انڈہ اور دلیہ۔ جب آپ کا بچہ اس قابل ہو جائے کہ نرم غذا تھوے یا الٹی کے بغیر کھا سکتے اور رُضم کر سکتے تو پھر آپ اسے باقاعدہ خوراک دینا شروع کر دیں تاہم بہت ضروری ہے کہ کم از کم ایک روز تک تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔

## سرگرمیاں:

آپ کا بچہ اگلے چند گھنٹوں کے دوران غنودگی محسوس کر سکتا ہے، اس کا سر چکر سکتا ہے اور وہ بے وجہ چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتا ہے اور یقیناً وہ سست بھی رہے گا۔ اگر آپ کا بچہ یا بچی ایک سال سے کم عمر کا ہے تو اینسٹیمیز یا بے ہوشی کے بعد کئی گھنٹے تک وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ کسی سہارے کے بغیر اپنا سر اوپر اٹھا سکے۔ ضرورت پڑے تو آپ اپنے بازو کا سہارا دے کر یا اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا سر اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ سانس کے راستے کھلے رکھنے کیلئے بچے کا مناسب پوزیشن میں ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ بچے کی ٹھوڑی اسکی چھاتی سے دور رکھنے میں اس کی مدد کریں، کارکی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس بات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ بچے کی ٹھوڑی اسکی چھاتی سے دور رہے۔ جب تک بے ہوشی کا اثر ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک بچے کو اکیلے چلنے نہ دیں کیونکہ اس

طرح بچے کے گرجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ بے ہوشی کا اثر ختم ہونے میں چھ گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک پورا دن بچے کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دیں جس پر پورے جسم کا زور لگتا ہو یا توازن قائم رکھنا پڑتا ہو جیسے بیڑھیاں چڑھنا اور سائیکل پر سواری کرنا۔

## سوننا:

گھر واپس جانے کے بعد آپ کا بچہ غنودگی میں ہوگا یا سوراہا ہوگا۔ آپ وقفے وقفے سے بچے کا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ ٹھیک سے سانس لے رہا ہے اور یہ کہ وہ تھوے تو نہیں کر رہا اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچہ کروٹ لے کر سوئے۔

## ادویات اور دیگر احتیاطی تدابیر:

آپ اپنے بچے کو زلہ زکام کی کوئی دوا نہ دیں البتہ دیگر ہر طرح کی ادویات پھر شروع کر دیں۔ اگلے ایک دو روز تک سوئی (Branula) لگنے والی جگہ میں سوزش رہے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ وہ جگہ دکھ رہی ہے۔ گرم کور سے اس سوزش اور درد میں کمی لائی جاسکتی ہے۔ اگر یہ جگہ گرم ہو جائے، پھول جائے یا اس میں درد محسوس ہو تو درج ذیل نمبروں پر ہسپتال سے رجوع کریں۔

## رابطے کیلئے معلومات:

اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں تو ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے نمبروں پر فون کیجئے:

5136 5000 3590 42 92+ ایسٹیشن 5136 اگر آپ کے بچے کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو یا آپ اسے جگانے میں کامیاب نہیں ہو پارہے یا اس کی رنگت ہو رہی ہے تو آپ کو اسے نزدیکی ہسپتال لے جانا چاہئے تاکہ فوری طبی امداد حاصل کی جاسکے۔