

سرکس/ائینڈ و میپریل کینسر کے مریض کی معلومات



شوکت خانم
اینڈریسرج سینٹر
میوریل کینسر ہسپتال

Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre
7A Block R-3, Johar Town, Lahore, Pakistan.
Tel: 042 359 5000 | UAN: 111 155 555
www.shaukathkhanum.org.pk

MISSION STATEMENT

To act as a model institution to alleviate the suffering of patients with cancer through the application of modern methods of curative and palliative therapy irrespective of their ability to pay, the education of health care professionals and the public and perform research into the causes and treatment of cancer.

ثانوی کینسر

ریڈ یو تھر اپی کے ساتھ بہت ہی حقیر خطرہ مسلک ہے جس میں کچھ سالوں بعد وسرے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ فالو اپ معائنے کے لئے آتے رہیں اور اپنے ڈاکٹر کوئی علامات سے آگاہ کرتی رہیں۔

کیمپھر اپی

اگر ریڈ یو تھر اپی کے ساتھ ساتھ آپ کی کیمپھر اپی کی جاری ہو تو آپ کو پانچ خوا کیس دی جائیں گی۔ ریڈ یو تھر اپی کے مرحلہ کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ میں ایک مرتبہ کی جائے گی۔

ہر مرحلہ سے پہلے آپ کی معانیج ٹیم آپ کا دوبارہ معائنے کرے گی اور آپ کے ہفتہوار بلڈ ٹیسٹ بھی لئے جائیں گے۔ اس سے ثابت ہو گا کہ کیا آپ کیمپھر اپی کے اگلے سائیکل کو جاری رکھنے کے قابل ہیں۔

ڈاکٹر آپ کے ساتھ علاج کے عمل کی وضاحت کرے گی۔ برائے مریبانی اسے احتیاط سے پڑھیں۔

فالو اپ ملاقاتیں

ہسپتال کے دورے

ہسپتال میں آپ کی اپنے آنکا جوست کے ساتھ آپ کی فالو اپ ملاقاتیں ہوں گی۔ پہلی ملاقات آپ کے آخری مرحلہ کے چار سے پنج ہفتوں بعد ہو گی۔

اس ملاقات میں آپ کی ڈاکٹر جائزہ لے گی اور آپ کی بہتری سے متعلق آپ کو آگاہ کرے گی۔ اور آپ سے جاری ضمی اثرات کے بارے میں پوچھنے گی اور آئندہ کی ملاقات کی منصوبہ بندی کرے گی۔

اگلے پانچ سال کے لئے باقاعدہ ہفتلوں سے آپ کا معائنہ کیا جائے گا۔ ان ملاقاتوں میں ڈاکٹر آپ کی عمومی صحت اور خصوصی طور پر آپ کے مقدار اور مثناہ کے کام کے بارے میں سوالات پوچھنے گی۔ وہ آپ کا اندر و فی معائنے کریں گی۔ وہ آپ کی ہمہ داشت کے بارے میں مستقبل کا لآخر عمل طے کریں گی۔

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسے ذیل میں درج کریں اور ملاقات میں ساتھ لے کر آئیں۔

کے ہوتے ہیں جس سے ان کی زندگی کو کم خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پورخراک اور یاماں کی باقاعدہ مقدار لینے سے قابو پایا جاسکتا ہے۔

بیس خواتین میں سے ایک میں زندگی کے لئے خطرناک اثرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان میں پیش، دردا و خون بہنا شامل ہیں۔

برائے مریبانی مشناہ اور مقدار متعلق تکلیف کے بارے میں ہماری ٹیم کو آگاہ کریں۔ تاکہ آپ کا معائنہ کیا جاسکے اور بوقت ضرورت ماہر کی سفارش کی جاسکے۔

فرج / شرم گاہ

جب ریڈ یو تھر اپی کے بعد جم کے ٹوزمنڈل ہونا شروع ہو جائیں تو خفیف داغ اور ورم بن سکتے ہیں۔ فرج سے مسلک عضلات سخت ہو سکتے ہیں جس سے ان کی پلک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

جس سے آپ کی شرم گاہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جس سے فالو اپ کلک میں فرج کا معائنہ اور ازدواجی تعلقات میں مشکل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے علاج کے دوران آپ کی شرم گاہ کو کشادہ کرنے کے آلات لگائے جاتے ہیں تاکہ ورم اور زخم سے بچا جاسکے۔ تاکہ آپ کا فرج / شرم گاہ جس طرح ممکن ہو سکے پلک دار رہے۔

بیضہ دنیا (حیض کی بندش سے قبل کی خواتین)

ریڈ یو تھر اپی آپ کی بیضہ دنیوں کو متاثر کرے گی جس سے ان کا کام بند ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل اثر ہے جس کا مطلب ہے آپ بانجھ ہو جائیں گی (حمل کے قابل نہ ہونا) اور آپ کا جسم حیض کی دائی بندش یا سن یا س میں چلا جائے گا۔ اگر آپ کو ابھی بھی ماہواری جاری ہوتی ہے تو علاج کے دوران یا اس کے فوراً بعد آپ کا حیض آنابند ہو جائے گا۔

ہڈیاں

ریڈ یو تھر اپی سے آپ کی ہڈیوں کی کشافت متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہڈیوں میں باریک بالوں کی طرح درازیں پڑ جائیں گی۔ یہ ریڈ یو تھر اپی علاج کے چند ہفتوں یا سالوں کے بعد ظاہر ہو سکتی ہے۔ جس سے پیلوں میں مستقل دردا و قع ہو سکتا ہے۔ ان درازوں کو دواؤں، ورزش اور کیلشم سے بھر پورخراک سے دور کیا جاسکتا ہے۔

بعض اوقات شدید درد ہوتا ہے اور باقاعدہ دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے پیلوں میں درد محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تاکہ وہ مزید تحقیق کر سکیں۔

آپ کے سروکل کینسر کے علاج کے لئے آپ کی ڈاکٹر مدد طریقہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس میں ریڈیو تھیراپی، بیکوتھراپی اور سر جری شامل ہیں۔ عموماً ان میں سے صرف ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی بھار ایک سے زائد طریقہ استعمال کئے جاتے ہیں۔

ہر طریقہ انفرادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر ہی اس کی وضاحت کرے گی کہ کون سا علاج تجویز کیا جائے اور کتنے عرصہ کے لئے علاج جاری رہے گا مزید برآں اس علاج سے جڑے خطرات اور فوائد سے بھی آگاہ کرے گی۔

چونکہ آپ کوسرویکل کینسر/بوئیس کینسر کے لئے ریڈیو تھیراپی کا علاج تجویز کیا گیا ہے اس لئے آپ کو یہ مواد فراہم کیا گیا ہے۔ موقع صورت حال سے آگاہ کر کے ہم آپ کو لاحق ہونے والی تکلیفوں میں کمی کرنے کے لئے پرمادید ہیں۔ خاندان کے انفراد اور دوست کمی اس کو مدعاگار پائیں گے۔

ریڈیو تھیراپی کیا ہے؟

ریڈیو تھیراپی ایسا علاج ہے جس میں اعلیٰ طاقت سے بھر پورا ایکس ریز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علاج لینیر ایکسلیپر (Linacs) سے کیا جاتا ہے۔ ریڈیو تھیراپی کا علاج روزانہ کی بنیاد پر ”وقوف“ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ہر فرد کا علاج مختلف اور انفرادی منصوبہ بنندی سے کیا جاتا ہے۔

علاج کے لئے منصوبہ بنندی / تیاری

ریڈیو تھیراپی کے آغاز سے پہلے آپ کو منصوبہ بنندی / تیاری کے لئے آنا ہوگا۔ اس میں ریڈیو تھیراپی کے آغاز سے پہلے آپ کو منصوبہ بنندی / تیاری کے لئے آنا ہوگا۔ اس میں ریڈیو تھیراپی ڈیپارٹمنٹ جانا ہوگا جس میں تھیراپی ریڈیو گرافر / ڈاکٹر آپ سے پورے عمل کی وضاحت کرے گا اور کاغذی کارروائی کو مکمل کرے گا۔

پلاننگ / تیاری میں آپ کا کیا ہیں؟

ہم یہ یقینی نہیں گے آپ کے اندر وہی اعضاہ ہر علاج کے لئے بہتر حالت میں ہیں۔ اس عمل کے لئے پلاننگ سکین سے پہلے آپ کو کچھ تیاری کرنا پڑے گی۔ آپ کے علاج سے پہلے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔

مشاند کی تیاری

سی ٹی سکین کے لئے آپ کو بھرے ہوئے مشاند کی ضرورت ہے۔ ریڈیو گرافر آپ کو 2 سے 4 کپ

پیٹ کے علاج سے آپ کمزوری (متلی) محسوس کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ان جگہوں کا علاج کروارہ ہے ہوں تو علاج سے پہلے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر متلی سے چاؤ کی دوا تجویز کی جائے گی۔

مشاند

ریڈیو تھیراپی کے علاج والی جگہ آپ کی جلد میں سوژش ہو سکتی ہے۔ یہ سرخ، خشک اور زیادہ حساس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اثر صرف پیلوں کے ارد گرد جلد پر ہو گا (جیسا کہ کمراور ٹانگوں کے اوپری حصہ کے درمیان) جس کے لئے آپ کو کچھ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ باقی جسم کے لئے کوئی خاص خصائص اقدامات نہیں کرنا پڑتے۔

ریڈیو تھیراپی علاج کے آغاز سے دو سے تین ہفتے بعد آپ کی جلد پر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کہ حسب معمول ہوتا ہے۔ تھیراپی کے مکمل ہونے کے لئے ہفتوں تک یہ اثر ہوتا رہتا ہے۔

میں کس سے ضمیمی اثرات سے متعلق بات کر سکتی ہوں؟

اپنی پہلی پلاننگ ملاقات پر ڈاکٹر مکمل ضمیمی اثرات سے متعلق آپ سے بات کرے گی۔ آپ معالج ٹیم کے رکن کی جانب سے ہفتہ وار جائزہ لفڑی میں بھی دکھا سکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی ضمیمی اثرات محسوس کر رہی ہوں تو اپنی معانچے ٹیم کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔

ضمیمی اثرات کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں؟

علاج ختم ہونے کے بعد ضمیمی اثرات جاری رہتے ہیں یا کچھ عرصہ کے لئے مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ تاہم کچھ ہفتوں میں یہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ معمول کے مطابق ہیں۔ اس عرصہ کے دوران آپ کو علاج کے دوران دی گئی تجویز پر عمل جاری رکھیں۔ اور جب تک ضمیمی اثرات ختم ہوں اس وقت تک اس کے لئے جاری کی جانے والی دوا کو جاری رکھیں۔

ٹویل مدتی ضمیمی اثرات کیا ہیں؟

ریڈیو تھیراپی کے ختم ہونے کے بعد ٹویل مدتی ضمیمی اثرات مہینوں اور سالوں تک جاری رہتے ہیں۔ ان تاخیری ضمیمی اثرات کو جانچنا بہت مشکل ہے لیکن اگر یہ قوع پذیر ہو جائیں تو میں تو مستقل رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ان تاخیری ضمیمی اثرات کے امکانات کے بارے میں علاج کی رضامندی پر دھنٹکے وقت وضاحت کرتی ہے۔

مقعد اور مشاند

پانچ خواتین میں سے ایک میں تاخیری اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر معمولی نوعیت

رفع حاجت میں جلدی کا احساس چیپش

کشیر مقدار میں مائع لینا اور اپنی عمومی خواراک لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو مقدمہ میں کوئی تبدیلی محسوس ہو تو ڈاکٹر آپ کو مناسب ادویات کی تجویز دے سکتی ہے یا خواراک میں تبدیلی کا کہہ سکتی ہے۔

مشاند

ریڈیو تھیراپی سے آپ کو مشاند میں بچینی محسوس ہو سکتی ہے۔ جس کی وجہ سے درج ذیل اثرات مرتب ہو سکتے ہیں:

- ✓ بیت الخالہ میں جانے کی حاجت میں انتہائی اضافہ
- ✓ اپنے بلیڈر کو خالی کرنے کی جلدی
- ✓ ورم مشاند کی طرح جلن کا احساس

اگر آپ ان میں سے کسی بھی قسم کی شکایت محسوس کریں تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کیش مقدار میں مائع لینا اور اپنی معانچے ٹیم کے رکن کے ساتھ رابطہ کریں۔

فرجن / شرم گاہ

آپ کے فرج / شرم گاہ میں بچینی ہو سکتی ہے جس سے بے سکونی ہو سکتی ہے جیسا کہ جلن، سوژش اور اونگی اور غیرہ۔ آپ رحم کے اخراج میں زیادتی بھی محسوس کریں گی۔ اگر یہ بہت زیادہ ہو اور / یا اس کی ناقابل برداشت بوجو تو برائے مہربانی معانچے ٹیم سے رابطہ کریں۔ پیلوں، نسوانی دفع بدھو، پچکاری یا پاؤڑ کا استعمال مت کریں کیونکہ ان سے بے سکونی اور بے چینی بڑھ جاتی ہے اور یہاری لگ سکتی ہے۔

تحکاٹ

اس علاج کے دوران اور بعد میں آپ تھکن اور معمول سے کم تو انائی محسوس کریں گی۔ یہ موقع اثر ہے۔ یہاں وجہ سے ہے کہ آپ کا جسم معمولی غلیات کی تھوڑی پھوڑ کر بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے جسم کی سینیں اور جب آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں۔

کمزوری / جی متلانا

پیلوں کی ریڈیو تھیراپی میں آپ کمزوری (متلی) محسوس کریں گی۔ اگر آپ کمزوری محسوس کریں تو برائے مہربانی اپنی معانچے ٹیم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو تکلیف سے بچانے کے لئے مناسب دوا تجویز کر سکیں۔

پانچ پہنچے گا اور سکین سے پہلے 30 منٹ تک انتظار کرے گا۔ اس عرصے میں اپنے مشاند کو خالی نہ ہونے دیں۔

مقعد کی تیاری

سکین کے لئے آپ کا مقعد بالکل خالی ہونا چاہئے۔ اپنے سکین کے دن جب آپ ملاقات کے لئے آئیں تو آپ صبح یہ رفع حاجت سے فراغت کی کوشش کریں۔

اپنے پلاننگ ملاقات کے وقت مقعد کو خالی کرنے کے لئے آپ کو اپنیما بھی دیا جا سکتا ہے۔ ریڈیو گرافر آپ کا سے استعمال کرنے کے بارے میں بتائے گا۔ علاج کے لئے آنے سے پہلے آگر آپ نے پانچ مقدار خالی کر لیا ہے تو پھر بھی ہر ریڈیو تھیراپی علاج کے لئے آپ کمزورانہ یہ عمل دھرانا ہو گا۔

حمل میٹ

اگر علاج کے دوران آپ محسوس کریں کہ آپ حاملہ ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کے عملہ کے رکن کو اس کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔

علاج کے لئے ملاقات میں

مجھے کتنی مرتبہ علاج کے لئے بلا یا جائے گا؟

ڈاکٹر وضاحت کرے گا کہ آپ کے علاج کے لئے کتنے مراحل درکار ہیں۔ آپ کے علاج میں بیرون سے جمع تک عموماً روزانہ کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے۔ ریڈی ایشن کا شعبہ پلاننگ ملاقات میں ہی علاج کا عمل بتا دیتا ہے۔

ہر مرحلہ کے لئے آپ کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو آنے میں دشواری ہو تو آپ ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ (برائے مہربانی رابطہ کی معلومات کے لئے کتابچہ کے آخر میں دیکھیں)

کیا مجھے علاج کے لئے تیاری کی ضرورت ہے؟

جب آپ علاج کی پلاننگ ملاقات کے لئے مقدار اور مشاند کی تیاری کر کے آئے تھے بالکل اسی طرح سے آپ کو تیاری کرنا ہوگی۔

کیا اس کے ضمیمی اثرات ہیں؟

ریڈیو تھیراپی علاج کے دوران آپ کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے تاہم علاج کے عرصہ کے دوران آپ کوئی ضمیمی اثرات کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے۔

مقعدی اثرات

جب ریڈیو تھیراپی سے آپ کا مقعد متاثر ہونے کی وجہ سے درج ذیل اثرات ہو سکتے ہیں: