

ضرورت پڑ سکتی ہے یا اندروفنی مٹٹ لگا کر جلق کو کشادہ کیا جاسکتا ہے۔

سنس کی تکلیف

تابکاری سے سوزش (نمونیا) اور پچھپڑوں کا درم (فابر و سز) ہو سکتا ہے اگر ریڈ یو تھراپی پچھپڑوں کے پاس کی جائے۔ یہ عموماً علاج ختم ہونے کے دو سے تین ماہ بعد تک ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لئے سانس کی ورزش کو سمجھنا ضروری ہے یادو اکا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے جس سے سانس میں تکلیف سے بچا جاسکتا ہے۔ آپ کی معالج ٹیم آپ کی مدد کرے گی۔

علاج کے بعد

آپ کو آنکا لو جی نسلٹنٹ کی جانب سے نظر ثانی کے لئے بیرونی مریضان کنک میں بھیجا جاسکتا ہے۔ اور بوقت ضرورت مزید تشخیص کی جاتی ہے۔

ہمارے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے؟

ریڈ یو تھراپی علاج کے دوران آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو اپنے مقررہ فالاپ دن کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

MISSION STATEMENT

To act as a model institution to alleviate the suffering of patients with cancer through the application of modern methods of curative and palliative therapy irrespective of their ability to pay, the education of health care professionals and the public and perform research into the causes and treatment of cancer.



یہ کتابچہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے لئے ایسو فیکس (غذائی نالی) یا معدہ کے کینسر کے لئے ریڈ یو تھر اپی تجویز کی گئی ہے۔

عومی ریڈ یو تھر اپی کتابچے کے علاج میں کیا شامل ہے اور اس کے علاج میں کیا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ڈیپارٹمنٹ سے متعلق عومی معلومات بھی شامل ہیں۔ یہ کتابچہ ایسو فیکس (غذائی نالی) یا معدہ کے کینسر کے لئے ریڈ یو تھر اپی آپ کے لئے مجبود علاج کی قسم کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ اور علاج سے پہلے اور بعد میں آپ اپنی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔

کیمیو تھر اپی کے ساتھ ریڈ یو تھر اپی

رسوی کی بڑھوتری کو تقابل کرنے کے لئے کیمیو تھر اپی کے ساتھ ریڈ یو تھر اپی دی جاتی ہے۔ اس سے رسوی کے سائز میں کمی آ جاتی ہے اور کچھ صورتوں میں صحت یابی بھی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی ریڈ یو تھر اپی کیمیو تھر اپی کو بنیادی کیمیو۔ ریڈ یو تھر اپی کہتے ہیں۔ یہ پانچ سے چھٹے ہفتے پر منی دورانیہ پر روزانہ کی بنیاد پر 25 سے 28 مرتبہ دی جاتی ہے۔

کیمیو۔ ریڈ یو تھر اپی مندرجہ میں میں سے کسی ایک طریقہ سے دی جاتی ہے:
 1) سپلین انسپوشن (Rیڈ یو تھر اپی کے مرحلہ میں پہلے اور چوتھے ہفتے میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے) اور کچھ ٹینپن گولیاں روزانہ دی جاتی ہیں۔
 (یا)

2) سپلین انسپوشن (Rیڈ یو تھر اپی کے مرحلہ میں پہلے اور چوتھے ہفتے میں ایک دفعہ دی جاتی ہے) اور 5FU انسپوشن بذریعہ کیمیو تھر اپی پپ (علاج کے پہلے اور چوتھے ہفتے کے دوران پہلے سے چوتھے ہفتے تک دی جاتی ہے)۔
 (یا)

3) کاربوبلین اور پیکلی ٹیکسل انسپوشنز ریڈ یو تھر اپی کے مرحلہ کے دوران ہفتہ وار دی جاتی ہیں۔

کیمیو تھر اپی انسپوشن کی کیمیو تھر اپی بے یونٹ میں گرانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا ایسا علاج چل رہا ہو تو ڈاکٹر کلکٹ میں کیمیو تھر اپی طریقہ کارکی تفصیلات کی وضاحت کرے گا۔ اور آپ کیمیو تھر اپی کی معلوماتی شیٹ فراہم کرے گا۔

تحکن

آپ خاص طور پر علاج کے آخری مرحلہ میں تحکن محسوس کریں گے۔ نیند کو بحال کرنے کے لئے اپنے آپ کو مزید وقت دیں۔ علاج کے کمل ہونے کے چند ہفتے بعد تھکاؤٹ ختم ہو جائے گی۔

متلی (کمزوری محسوس کرنا)

آپ کے علاج کے دوران آپ کو متلی محسوس ہو سکتی ہے۔ ہم ہر مرحلہ سے پہلے آپ کو متلی دور کرنے کی ادویات دیں گے۔ اگر ان ادویات کے استعمال کے باوجود آپ کو متلی جاری رہے یا آپ قے کر رہے ہوں تو برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی دواتبدیل کی جاسکے۔

جلدی ری ایکشن / جلد راثرات

غذا جیسا کہ کڑھی، مرچیں، سرک، ٹماٹر اور سترس پھل وغیرہ مت کھائیں۔ کمرہ کے درجہ حرارت پر رکھی غذا اور مشروبات پینا بہتر ہے۔

خشک کھانی

آپ کو خشک کھانی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پانی میں یادگیر مشروبات پینے سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سادہ کھانی کی دوا کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ریڈ یو تھر اپی کی وجہ سے تکلیف علاج کمل ہونے کے چند ہفتے میں ٹھیک ہو جانی چاہئے۔

مکنہ طویل مد تی ضمی اثرات

ریڈ یو تھر اپی کے اختتام کے کئی مہینوں یا سالوں بعد اس کے ضمی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان ضمی اثرات کو جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بدقتی سے اگر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو مستقل ہوں گے۔ ہم علاج کی مخصوصہ بندی کے دوران رسوی کے ارد گرد جگہوں کو لحاظ خاطر رکھتے ہیں تاکہ اس کے ضمی اثرات کم سے کم ہوں۔

غذا کی نالی (ایسو فیکس) کا تنگ ہونا

ریڈ یو تھر اپی سے حلق تنگ رہتا ہے اور اس کے بعد بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر علاج کمل ہونے کے بعد دو ماہ بعد بھی آپ تنگھنے میں مسلسل تکلیف محسوس کریں تو آپ کی مزید تشخیص اور علاج کیا جائے گا۔ اگر ریڈ یو تھر اپی کے بعد ورم کی وجہ سے حلق تنگ ہو جائے تو آپ کو بینڈ و سکوپی کی

علامات پر قابو پانے کے لئے ریڈ یو تھر اپی

مسئلہ پیدا کرنے والی کینسر سے متعلقہ علامات کے علاج کے لئے ریڈ یو تھر اپی کی جاتی ہے۔ چونکہ رسوی سے خوارک کی نالی تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نگھنے میں تکلیف ہوتی ہے یا اس سے درد یا خون رستا ہے۔ ریڈ یو تھر اپی کے ذریعے رسوی کو چھوٹا کر کے اس دباؤ میں آرام آتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کینسر کی گرتو ٹھر پر قابو پانے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے ریڈ یو تھر اپی کی جائے لیکن اس سے کمل طور پر چھوٹا نہیں پایا جا سکتا۔ اس قسم کی ریڈ یو گرافی کو جیلی ایشور ریڈ یو تھر اپی کہتے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 مرتبہ دی جاتی ہے یا صرف ایک دفعہ۔

خوارک

ریڈ یو تھر اپی کے دوران اور اس کے بعد کیلوریز اور پروٹین کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اپنے وزن کو برقرار رکھنے کے لئے اپنی خوارک میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ علاج کے دوران ہم آپ کے وزن کو برقرار رکھنے کے لئے بھر پور توجہ دیتے ہیں اور بہت احتیاط سے اس کی مگرانی کرتے ہیں۔ ہمارے غذائی مشوروں پر ہتنا زیادہ ہو سکے اس پر عمل کریں۔

فیڈ نگ ٹیوب

علاج کے آغاز سے پہلے اگر آپ کو نگھنے میں مسئلہ درپیش ہے تو آپ کو فیڈ نگ ٹیوب کی تجویز دی جاتی ہے جسے گیسٹر و سٹومی ٹیوب کہتے ہیں۔ یہ باریک ٹیوب ہوتی ہے جسے بیٹ میں چھوٹے سے سوراخ سے داخل کیا جاتا ہے۔ یہ نالی خوارک، پانی اور ادویات دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مائع کی زیادہ مقدار لینے میں تکلیف محسوس ہو تو زائد مائع کی مقدار کو سرخ کے ذریعے فیڈ نگ ٹیوب میں لگا کر دی جاتی ہے تاکہ آپ پانی کی سے بیچ جائیں۔ ہماری ڈائیٹیشن آپ کو بتائے گی کہ مائع کی کتنی مقدار درکار ہے۔ جیسے ہی آپ کا علاج کمل ہو جاتا ہے اور کھانے اور پینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو فیڈ نگ ٹیوب کو اتار دیا جاتا ہے۔ یہ عموماً ایک سادہ طریقہ کار ہے۔

ریڈ یو تھر اپی کے ضمی اثرات

ریڈ یو تھر اپی بغیر درکا علاج ہے۔ تاہم، اس علاج سے تعلق رکھنے والے کچھ ضمی اثرات بھی ہیں۔ علاج کے دوران آپ ان سب یا کسی ایک اثر کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن عموماً تمام ضمی اثرات اکٹھے ظاہر نہیں ہوتے۔