

ریڈیو تھراپی کے دوران جلد کی حفاظت



MISSION STATEMENT

To act as a model institution to alleviate the suffering of patients with cancer through the application of modern methods of curative and palliative therapy irrespective of their ability to pay, the education of health care professionals and the public and perform research into the causes and treatment of cancer.

ریڈیو تھراپی کے دوران جلد کی حفاظت

تابکاری/ریڈیو تھراپی سے جلد پر اثرات (سکن ری ایکشن) علاج کے سب سے عام ضمنی اثرات میں سے ہیں۔ جلد پر ان اثرات کی شدت کا انحصار کئی طبی عوامل پر ہے جیسا کہ علاج کی جگہ، ریڈی ایشن کا مجموعی دورانیہ اور غذائی صحت۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تابکاری سے سکن ری ایکشن پر مکمل طور پر قابو پایا جاسکے۔ مرطوب کریم کے باقاعدہ استعمال سے اس میں تاخیر کی جاسکتی ہے اور سکن ری ایکشن کی شدت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ تاہم، ری ایکشن جلد کی شکنوں سے، سگریٹ نوش اور کیو تھراپی والے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔

سکن ری ایکشن ریڈیو تھراپی کے دوسرے سے تیسرے ہفتے تک شروع ہو جاتا ہے اور علاج کے آخری ہفتہ یا علاج مکمل ہونے کے سات سے دس دن کے اندر شدید ہو جاتا ہے۔ علاج کے مکمل ہونے کے بعد یہ چار ہفتوں تک برقرار رہتا ہے۔

مریضوں کو کیا کرنا چاہئے؟

1. کاٹن کے ڈھیلے کپڑے پہنیں۔
2. متاثرہ جگہ پر ریز/اسٹری کے استعمال اور شیو مت کریں یا بال اتارنے کے لئے ویکس کا استعمال نہ کریں۔
3. متاثرہ جگہ کو سورج کی براہ راست روشنی سے بچائیں۔
4. متاثرہ جگہ یا علاج والی جگہ کو دھونے کے لئے نیم گرم پانی استعمال کریں۔
5. انہیں نہاتے ہوئے زیادہ دیر تک گیلا نہ رکھیں بلکہ اسے نرم تولیہ کے ساتھ خشک کریں اور رگڑیں نہیں۔
6. خوشبودار صابن، ٹالکم پاؤڈر اور پرفیومز کے استعمال سے علاج والی جگہ پر جلد خراب ہو جاتی ہے۔
7. مرطوب کریم کو اس جگہ پر نرمی سے لگائیں۔
8. مزید چوٹ یا انفیکشن سے بچنے کے لئے پچھی ہوئی جلد پر ڈاکٹر کے مشورے کے

مطابق مناسب پٹیاں اور مرہم/کریم استعمال کریں۔
بوقت ضرورت درد کی دوا استعمال کریں۔